

Протоколы применения

NATURAL REDUCING EXTRACT Протокол применения: для процедуры удаления целлюлита и лишнего объёма за счет дренирования межклеточного пространства.

Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 5 мл на 200 кв. см на 1 процедуру. Для комфортной процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина 2% на 5 мл. коктейля. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 12 или 30G x 13 мм. на глубину 6 - 10 мм. в подкожно-жировую ткань. В каждый вкол вводится 0,1 мл. Расстояние между вколами 1 - 1,5 см. Можно обрабатывать до 4-х симметричных зон, вводя до 40 мл. коктейля в один прием.

Интервал между процедурами 5 дней. Курс 5 - 10 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Можно применять на теле, шее, подбородке, щечной области, интраорбитально

CEIU PRO Протокол применения: для процедуры удаления целлюлита и лишнего объёма за счет улучшения микроциркуляции и ускоренного окисления жирных кислот

Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 5 мл. на 200 кв. см. на 1 процедуру. Для комфортной процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина 2 % на 5 мл. коктейля. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 12 или 30G x 13 мм. на глубину 6 - 10 мм. в подкожно-жировую ткань. В каждый вкол вводится 0,1 мл. Расстояние между вколами 1 - 1,5 см. Можно обрабатывать до 4-х симметричных зон, вводя до 40 мл. коктейля в один прием.

Интервал между процедурами 5 дней Курс 5 - 10 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Можно применять на теле, шее, подбородке, щечной области, интраорбитально.

PHOSFATIDYLCHOLINE Протокол применения: для процедуры безоперационная липосакция

Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 5 ml. на 200 кв. см. на 1 процедуру. Для комфортной процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина 2 % на 5 мл. коктейля. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 12 или 30G x 13 мм. на глубину 6 - 10 мм. в подкожно-жировую ткань. В каждый вкол вводится 0,1 мл. Расстояние между вколами 1 - 1,5 см. Можно обрабатывать до 2-х симметричных зон, вводя до 20 мл. коктейля в один прием.

Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 5 - 10 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Не применять на лице, подбородке и шее!

MELILOTO+ RUTINE Протокол применения: для процедуры укрепления сосудистой стенки, увеличение микро циркуляции, ускорения утилизации жира, устранение отеков
Способ применения: в моновиде и коктейлях внутривожно, 6-10 процедур с интервалом 5-7 дней.
Техника введения: поверхностный и срединный наппаж.

ARTICHOKE EXTRACT 2% Действие: липолитическое, противоотечное, усиливает микро циркуляцию, легкое желчегонное и мочегонное средство.
Показания: липолитические программы с липолизом, после липосакции.
Противопоказания: желчекаменная болезнь, почечнокаменная болезнь, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения: в моновиде и коктейлях в подкожно жировую клетчатку, 6-10 процедур с интервалом 5-7 дней .
Техника введения: инфльтрация

CAFFEINE 10% Действие: способствует окислению жирных кислот опосредованно, после утилизации излишков глюкозы, стимулятор нервной системы, выраженный липолитический эффект при целлюлите и локальных жировых отложениях.
Показания: локальные жировые отложения, целлюлит.
Противопоказания: гипертония, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения: в моновиде и коктейлях, 2-3 процедуры с интервалом 5-7 дней.
Техника введения: поверхностный, срединный наппаж, инфльтрация, папулы.

SILANOL 1% Действие: антиоксидант, стабилизирует клеточные стенки, стимулирует коллагеновые волокна и эластин, является структурной единицей липидожировых мембран клеток, поддерживает структурную укладку волокон коллагена, универсальный компонент любого коктейля для омоложения и ликвидации целлюлита.
Показания: анти-эйдж программы, липолитические программы, целлюлит, алоpecia.
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения: в моновиде и коктейлях подкожно, внутривожно, 6-10 процедур с интервалом 5-7 дней.
Техника введения: поверхностный, срединный наппаж, инфльтрация, папулы.

L-CARNITINE 20%. Состав: L-Карнитин 20%, Экстракт листьев зеленого чая.
Действие: Переносчик жирных кислот через внутреннюю мембрану митохондрий . Облегчает сжигание жира собственными клетками.
Показания: локальные жировые отложения, целлюлит.
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения: в моновиде и коктейлях в подкожно-жировую клетчатку, 6-10 процедур с интервалом 5-7 дней.
Техника введения: инфльтрация.

DMAE 3% Состав: 2 диметиламиноэтанол 4 ацетоаминобензоат 3%
Действие: антиоксидант, стимулятор синтеза ацетилхолина в нейро-мышечных синапсах дермы, стабилизатор клеточных стенок, противовоспалительный эффект. Подтягивает кожу, делает ее упругой, омолаживает структуру.
Показания: подтягивающая анти-эйдж терапия лица, шеи и декольте.
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения: в моновиде и коктейлях.
Техника введения: наппаж и папулы.
Внимание! Для кожи лица, шеи, декольте и тыльной части рук (особенно для пациентов после 40 лет). Первые 3 процедуры проводятся только техникой наппаж, т.к. папульное введение без активации микроциркуляции может вызвать задержку папул на 3 -4 недели!

ASCORBIC ACID 20% VIT. C Состав: Аскорбиновая кислота 20%

Действие: мощный антиоксидант, стимулятор обмена, стимулятор синтеза коллагена и эластина, противовоспалительный, отбеливающий эффекты.

Показания: анти-эйдж программы, пигментации «кожа курильщика», профилактика фотостарения (до и после), поверхностный пиллинг (особо эффективен с пируватом пропорция 1:1), акне, алопеция.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения: в моновиде и коктейлях, 6-10 процедур с интервалом 5-7 дней.

Техника введения: поверхностный, срединный наппаж

HYALURONIC ACID 1%, 2% 3% Cube 3 Протокол применения: (ревитализант с выраженным гидратирующим эффектом) Для процедуры ревитализации и восполнения объёма. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами. В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 4 - 5 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели.

LIPOCUT Протокол применения: для процедуры безоперационная липосакция Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 5 мл. на 200 кв. см. на 1 процедуру. Для комфортной процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина 2 % на 5 мл. коктейля. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 12 или 30G x 13 мм. на глубину 6 - 10 мм. в подкожно жировую ткань. В каждый вкол вводится 0,1 мл. Расстояние между вколами 1 - 1,5 см. Можно обрабатывать до 2-х симметричных зон, вводя до 20 мл. коктейля в один прием. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 5 - 10 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Не применять на лице, подбородке и шее!

LIPOBURN Протокол применения: для процедуры удаления целлюлита и лишнего объёма за счет дренирования межклеточного пространства. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 5 мл. на 200 кв. см. на 1 процедуру. Для комфортной процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина 2 % на 5 мл. коктейля. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 12 или 30G x 13 мм. на глубину 6 - 10 мм. в подкожно жировую ткань. В каждый вкол вводится 0,1 мл. Расстояние между вколами 1 - 1,5 см. Можно обрабатывать до 4-х симметричных зон, вводя до 40 мл. коктейля в один прием. Интервал между процедурами 5 дней. Курс 5 - 10 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Можно применять на теле, шее, подбородке, щечной области, интраорбитально.

AMPELOSLIM Протокол применения: для процедуры уменьшения жировых отложений (апоптоза адипоцитов). Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 5 мл. на 200 кв. см на 1 процедуру. Для комфортной процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина 2 % на 5 мл. коктейля. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 12 или 30G x 13 мм. на глубину 6 - 10 мм. в подкожно жировую ткань. В каждый вкол вводится 0,1 мл. Расстояние между вколами 1 - 1,5 см. Можно обрабатывать до 4-х симметричных зон, вводя до 40 мл. коктейля в один прием. Интервал между процедурами 5 дней. Курс 5 - 10 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев.

HAIRCARE Протокол применения: для процедуры остановки выпадения и поддержания роста волос. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Для комфортной процедуры добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль или обезболить ультракаином верхнюю часть кожи головы. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 2 - 3 мм. в кожу микропапулы. В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 12 - 15 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели

ACTIVE PEPTIDE + HA Протокол применения: (многокомпонентный ревитализант со стимулирующим эффектом) для процедуры ревитализации с восполнением структуры межклеточного матрикса. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами. В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 4 - 7 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели.

ACNE PRO Протокол применения: для процедуры анти акне. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2 мл. на 1 процедуру лицо, 2 мл. шея, 2 мл. - декольте. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микропапулами вокруг инфилтратов! в каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 5 - 7 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели.

PDRN PRO Протокол применения: (многокомпонентный ревитализант со стимулирующим эффектом) для процедуры ревитализации с восполнением структуры межклеточного матрикса. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами. В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 4 - 7 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели.

FACELIFT SYSTEM 20 Протокол применения: (бустерлифтинг биоревитализация от 35 лет по показаниям) для процедуры бустерлифтинг биоревитализации с выраженным лифтингом. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,0 мл. - 2,5 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. 2,0 - 2,5 мл. - декольте, 2 мл. - кисти рук. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами. В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Наносить гель Ботуалекс для потенцирования эффекта расслабления мимических мышц. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 2 - 4 процедуры. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели по показаниям.

FACELIFT SYSTEM 10 Протокол применения: (бустер лифтинг биоревитализация до 40 лет по показаниям) для процедуры бустер лифтинг биоревитализации с выраженным лифтингом. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,0 мл. - 2,5 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. 2,0 - 2,5 мл. - декольте, 2 мл. - кисти рук. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами. В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Наносить гель Ботуалекс для потенцирования эффекта расслабления мимических мышц. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 2 - 4 процедуры. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели по показаниям.

FACECARE Протокол применения: (ревитализант с лифтинг эффектом и расслаблением мимических мышц) Для процедуры ревитализации с лифтинг эффектом. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. 1,5 мл. - декольте. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами в каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 5 - 7 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели

GLUTA FACE Протокол применения: (стимулятор ревитализант) Для процедуры ревитализации с отбеливанием. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. 1,5 мл. - декольте. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3 - 0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Наносить гель Ботуалекс для эффекта расслабления мимических мышц. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели

BOTULOPEPTIDE Протокол применения: для процедуры расслабления мимической мускулатуры, разглаживания мимических морщин. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 1,5 мл. на 1 процедуру - Лицо. 1,5 мл. - шея. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 1 - 2 мм. в кожу микро папулами по СП схеме. В каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см. Наносить гель Ботуалекс для потенцирования эффекта расслабления мимических мышц на лице. Интервал между процедурами 5 дней. Курс 4 -7 процедур. Интервал между курсами 3 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели.

STRONGFIRM Протокол применения: для процедуры подтяжки лица, сокращение растяжек, лифтинг ревитализации. Дезинфицировать кожу спиртосодержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой коктейль в шприц из расчета 2,5 мл. - 3 мл. на 1 процедуру. Лицо + шея. 400 кв. см на теле для растяжек. Для комфортной процедуры добавить 0,3 -0,4 мл. лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32G x 4 мм. на глубину 2 мм. в кожу микро папулами по СП схеме. В каждый вкол вводится 0,05 мл - 0,1 мл. Расстояние между вколами 1 см. Наносить гель Ботуалекс для потенцирования эффекта расслабления мимических мышц на лице. Интервал между процедурами 5 - 7 дней. Курс 4 - 7 процедур. Интервал между курсами 4 - 6 месяцев. Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели. Возможно смешивание в одну процедуру Ampeloslim с рутин мелилотом 5:2 для дополнительного выведения жидкости из межклеточного пространства и достижения максимально быстрого уменьшения объёма. Можно применять на теле, шее, подбородке, щечной области, интраорбитально .

Протокол для Regrowset.

(локальная бустер ревитализация и общее омоложение) для процедуры локальной бустер ревитали

Дезинфицировать кожу спирт содержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой в шприц 5 мл гиалуроновой кислоты 2% CUBE 3, залить с помощью иглы гиалуроновую кислоту через резиновую пробку во флакон с леофилизатом Regrowset, плавно встряхнуть несколько раз до полного растворения леофилизата в гиалуроновой кислоте. Лицо+шея - 2,0 – 2,5 мл. Декальтэ – 2,0 – 2,5 мл, кисти рук – 2,0 мл. Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3-0,4 мл лидокаина в коктейль. Коктейль вводится с помощью иглы 32Gx4 мм на глубину 1 мм в кожу микро папулами в каждый вкол вводится 0,05 мл. Расстояние между вколами 1 см
Интервал между процедурами 7-10 дней

Курс 4 процедуры

Интервал между курсами 4 месяца

Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели по показаниям.

Для процедуры общего омоложения

Дезинфицировать кожу точки внутри мышечного введения наружного верхнего квадранта ягодицы

Смешать леофилизат с 2-3 мл для инъекций или Лидокаина 0,5%. Набрать через резиновую пробку иглой в шприц весь объем раствора из флакона

Ввести внутримышечно

Интервал между инъекциями 1 день

Курс 12 инъекций (на курс 12 флаконов леофилизата)

При дерматитах и псориазе курс внутри мышечных инъекций увеличивается до 24-х (на курс 24 флакона леофилизата) плюс ежедневные компрессы по 20 минут 1 н раз в день под пленку на видимые пораженные участки дермы в течение 14 дней.

Протокол для Alestem.

(локальный био бустер ревитализант)

для процедуры локальной био бустер ревитализации :Дезинфицировать кожу спирт содержащим антисептиком. Набрать через резиновую пробку иглой в шприц 5 мл гиалуроновой кислоты 2% CUBE 3, залить с помощью иглы гиалуроновую кислоту через резиновую пробку во флакон с леофилизатом Alestem, плавно встряхнуть несколько раз до полного растворения леофилизата в гиалуроновой кислоте.

Лицо+шея - 2,0 – 2,5 мл. Декальтэ – 2,0 – 2,5 мл, кисти рук – 2,0 мл

Для комфортной процедуры по показаниям добавить 0,3-0,4 мл лидокаина в коктейль.

Коктейль вводится с помощью иглы 32Gx4 мм на глубину 1 мм в кожу микро папулами в каждый вкол вводится 0,05 мл.

Расстояние между вколами 1 см

Наносить гель Ботуалекс для потенцирования эффекта расслабления мимических мышц.

Интервал между процедурами 7-10 дней

Курс 4 процедуры

Интервал между курсами 4 месяца

Поддерживающие процедуры 1 раз в 3 недели по показаниям.

